

## OČKOVACÍ KALENDÁŘ 2012

VĚK	OČKOVÁNÍ	
2 měsíce (od 9. týdne)	Hexavakcína	1. dávka
3 měsíce	Hexavakcína Prevenar 13	2. dávka 1. dávka - nepovinné
4 měsíce	Hexavakcína Prevenar 13	3. dávka 2. dávka - nepovinné
5 měsíců	Prevenar 13	3. dávka - nepovinné
11. až 15. měsíc	Prevenar 13	4. dávka - nepovinné
15 měsíců	Spalničky, zarděnky, příušnice	1. dávka
Do 18. měsíce	Hexavakcína	4. dávka
21. až 25. měsíc	Spalničky, zarděnky, příušnice	2. dávka
5. až 6. rok	Záškrt, tetanus, dáivý kašel	přeočkování
10. až 11. rok	Záškrt, tetanus, dáivý kašel, dětská přenosná obrna	přeočkování

Dopřejte mu  
ochranu před  
**13** typy  
pneumokoka.

*Prevenar 13*

Pomáhá chránit zdraví dětí



## OČKOVÁNÍ TERMÍN PŘÍŠTÍ NÁVŠTĚVY

den ..... hodina .....

den ..... hodina .....

den ..... hodina .....

den ..... hodina .....

den ..... hodina .....

den ..... hodina .....

Ke každému očkování  
si s sebou přineste:  
očkovací průkaz dítěte  
a průkaz pojišťovny

## Proč Prevenar 13?

- pomáhá chránit proti závažným pneumokokovým onemocněním jako jsou meningitidy, sepse a zápal plic.
- pomáhá chránit také proti častému a bolestivému zánětu středního ucha, způsobenému pneumokoky
- pomáhá chránit proti 13 typům pneumokoka
- lze bezpečně použít s hexavakcínou
- je součástí očkovacích programů ve více než 50 zemích světa

**Zeptejte se svého pediatra na Prevenar 13.**

*Prevenar 13*

Pomáhá chránit zdraví dětí



**Vakcína Prevenar 13 je částečně hrazena z veřejného zdravotního pojištění pro děti, u kterých jsou 3 dávky základního schématu aplikovány do 7. měsíce věku a přeočkování do 15ti měsíců věku. Maximální doplatek pro rodiče je ve výši 430 Kč za jednu dávku. Aktuální informace o očkování dětí Prevenarem 13 získáte u svého dětského lékaře nebo na stránkách [www.prevenar13.cz](http://www.prevenar13.cz).**

Použití přípravku Prevenar 13 by mělo být založeno na podkladě oficiálních doporučení, která berou v úvahu dopad invazivního onemocnění v různých věkových skupinách, jakož i epidemiologickou rozmanitost sérotypů v různých zeměpisných oblastech. V klinických studiích byly nejčastěji hlášené nežádoucí účinky reakce v místě vpichu, horečka, podrážděnost, nechutenství, zvýšená spavost a nespavost. Po vakcinaci přípravkem Prevenar 13 se u Vašeho dítěte mohou vyskytnout vedlejší účinky podobné těm, které se objevují i u jiných vakcín. Přecitlivělost na jakoukoliv složku přípravku představuje kontraindikaci jeho užití. Podobně jako u jiných vakcín i aplikace přípravku Prevenar 13 má být odložena u jedinců trpících akutním závažným horečnatým onemocněním. Přítomnost mírné infekce jako je nachlazení, by ale neměla být příčinou oddálení očkování. Prevenar 13 chrání pouze proti těm sérotypům pneumokoka, které vakcína obsahuje. Podobně jako jiné vakcíny nemůže ochránit všechny očkované jedince před pneumokokovým onemocněním.

**Prevenar 13 je registrovaný léčivý přípravek.  
Přečtěte si, prosím, pečlivě příbalovou informaci.**

Pfizer, spol. s r.o.  
Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5  
tel.: +420 283 004 111, fax: +420 251 610 270  
[www.pfizer.cz](http://www.pfizer.cz)

**[www.prevenar13.cz](http://www.prevenar13.cz)**



Pracujeme společně pro zdravější svět™

PRV2011.02.027