




## Pomoc v prevenci proti pneumokokovému zápalu plic začíná zde

Imunitní systém s rostoucím věkem slábne, existuje však možnost, jak mu pomoci, aby vás i nadále lépe chránil před pneumokokovým zápallem plic.

### Mějte na paměti následující skutečnosti:




Imunitní systém s věkem slábne, a tím se snižuje i jeho schopnost na nfekce účinně reagovat. Lidé ve věku 65+ jsou proto **náchylnější k onemocnění potenciálně závažnými onemocněními, mezi něž patří i pneumokokový zápal plic**, a to i při dostatečném pohybu a dodržování zdravého životního stylu.



Pneumokokový zápal plic způsobuje bakterie *Streptococcus pneumoniae*, která může v určitých případech vyvolat také těžké infekce krve (sepsi) nebo tkání pokrývajících mozek a míchu (meningitidu).



Pokud trpíte jedním či více chronickými onemocněními, jako jsou např. diabetes, chronické onemocnění srdce nebo astma, **může být riziko nákazy ještě vyšší. Očkování proti pneumokokům vás pomůže ochránit před pneumokokovým zápallem plic.**



Pneumokokové vakcíny **NEOBSAHUJÍ** živé bakterie, formaldehyd ani rtuť. **Z vakcíny se nemů žete nakazit pneumokokovým zápallem plic** a očkování se nemusí obnovovat každý rok.

Nyní máte dostatek informací...

**Zeptejte se svého lékaře na očkování proti pneumokokovému zápalu plic.**



PRV-2020.01.090

Zdravotní informace obsažené na této stránce jsou určeny pouze pro účely osvěty a nejsou zamýšleny jako náhrada za konzultaci s lékařem. Veškerá rozhodnutí týkající se péče o pacienta musí být učiněna ve spolupráci s poskytovatelem zdravotní péče s přihlédnutím k individuálním charakteristikám pacienta.

Prevenar 13 je registrovaný léčivý přípravek (vakcína proti pneumokokovým infekcím), jehož výdej je vázán na lékařský předpis. Přečtěte si, prosím, pečlivě příbalovou informaci. Prevenar 13 neposkytuje 100% ochranu proti typům pneumokoka, které vakcína obsahuje, a nechrání před typy neobsaženými ve vakcíně ani jinými mikroorganismy, které způsobují zápal plic.