

**Invazivní pneumokové onemocnění (meningitida, zápal plic, sepse)** je závažné onemocnění a **děti do 2 let věku patří k nejrizikovější skupině**. Časné zahájení vakcinace (od 6 týdnů) zajistí lepší a dřívější ochranu dítěte v době, kdy je nejzranitelnější!

**Prevenar 13 pomáhá imunitnímu systému dítěte vytvářet protilátky, které bojují proti 13sérotypům bakterie *Streptococcus pneumoniae*.**



Tak vakcina pomáhá chránit dítě před vznikem nejen závažných pneumokových onemocnění, ale snižuje i riziko onemocnění zánětem středního ucha. Vakcina neobsahuje živou bakterii, a proto nemůže způsobit onemocnění.

Zajistěte, aby Vaše dítě dostalo **všechny 3 doporučené dávky vakcíny**, které jsou nezbytné k zajištění ochrany proti pneumokovým onemocněním.

Mezi nejčastější sérotypy bakterie *Streptococcus pneumoniae* vývolávající invazivní pneumokové onemocnění v ČR patří sérotypy 19A a 3. Tyto sérotypy jsou obsaženy ve vakcíně Prevenar 13.

Účinnost a bezpečnost vakcíny Prevenar 13 byla ověřena v klinických studiích i v běžné praxi.

**Pomožte ochránit své dítě a porad'te se s dětským lékařem, kdy nejlépe začít s očkováním proti pneumokovým infekcím!**

