



Pomoc v prevenci proti pneumokokovému zápalu plic začíná zde

Imunitní systém s rostoucím věkem slábne, existuje však možnost, jak mu pomoci, aby vás i nadále lépe chránil před pneumokokovým zápalom plic.

Mějte na paměti následující skutečnosti:




Imunitní systém s věkem slábne, a tím se snižuje i jeho schopnost na infekce účinně reagovat. Lidé ve věku 65+ jsou proto **náchylnější k onemocněním potenciálně závažnými onemocněními, mezi něž patří i pneumokokový zápal plic**, a to i při dostatečném pohybu a dodržování zdravého životního stylu.



Pneumokokový zápal plic způsobuje bakterie *Streptococcus pneumoniae*, která může v určitých případech vyvolat také těžké infekce krve (sepsi) nebo tkání pokrývajících mozek a míchu (meningitidu).



Pokud trpíte jedním či více chronickými onemocněními, jako jsou např. diabetes, chronické onemocnění srdce nebo astma, **může být riziko nákazy ještě vyšší. Očkování proti pneumokokům vás pomůže ochránit před pneumokokovým zápalom plic.**



Pneumokokové vakcíny **NEOBSAHUJÍ** živé bakterie, formaldehyd ani rtuť. **Z vakcíny se nemůžete nakazit pneumokokovým zápalom plic** a očkování se nemusí obnovovat každý rok.

Nyní máte dostatek informací ...

Zeptejte se svého lékaře na očkování proti pneumokokovému zápalom plic.



Zdravotní informace obsažené na této stránce jsou určeny pouze pro účely osvěty a nejsou zamýšleny jako náhrada za konzultaci s lékařem. Veškerá rozhodnutí týkající se péče o pacienta musí být učiněna ve spolupráci s poskytovatelem zdravotní péče s přihlédnutím k individuálním charakteristikám pacienta.

Prevenar 13 je registrovaný léčivý přípravek (vakcína proti pneumokokovým infekcím), jehož výdej je vázán na lékařský předpis. Přečtěte si, prosím, pečlivě příbalovou informaci. Prevenar 13 neposkytuje 100% ochranu proti typům pneumokoka, které vakcína obsahuje, a nechrání před typy neobsaženými ve vakcinaci jinými mikroorganismy, které způsobují zápal plic.